

# Ceftionel-50

*Antibiotique semisynthétique à large spectre  
de la classe des céphalosporines*



*Pour le traitement des infections bactériennes du  
système respiratoire avec une action supplémentaire  
contre le piétin et la métrite aiguë chez les bovins*


# Ceftionel-50

Suspension pour voie parentérale

Le Ceftiofur est un antibiotique semi-synthétique à large spectre de troisième génération de la famille des céphalosporine administré aux bovins et aux porcs pour le contrôle des infections bactériennes du système respiratoire; il agit aussi contre le piéтин et la métrite aiguë chez les bovins. Il a un large spectre d'action chez les bactéries à gram-positif et à gram-négatif. Il exerce une action antibactérienne en inhibant la synthèse des parois cellulaires. Le Ceftiofur est principalement évacué dans les urines et les fèces.

## CONTIENT PAR ML

Base de ceftiofur ..... 50 mg.



## INDICATIONS

### Bovins:

Pour le traitement des infections respiratoires bactériennes causées par *Mannheimia haemolytica* (auparavant *Pasteurella haemolytica*), *Pasteurella multocida* et *Histophilus somni* (auparavant *Haemophilus somnus*). Pour le traitement des nécrobacillooses interdigitales aiguës (panaris, piéтин) associées à *Fusobacterium necrophorum* et *Bacteroides melaninogenicus* (*Porphyromonas asaccharolytica*).

Pour le traitement de la composante bactérienne des métrites post-partum aiguës (puerpérales) dans les 10 jours qui suivent le vêlage associées à *Escherichia coli*, *Arcanobacterium pyogenes* et *Fusobacterium necrophorum*, sensibles au ceftiofur.

### Porcs:

Pour le traitement des maladies respiratoires bactériennes associées à *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* et *Streptococcus suis*.

## POSOLOGIE

### Bovins:

- Infections bactériennes respiratoires: 1 ml pour 50 kg de poids corporel pendant 3 - 5 jours, en injection sous-cutanée.
- Nécrobacillooses interdigitales aiguës: 1 ml pour 50 kg de poids corporel pendant 3 jours, en injection sous-cutanée.
- Métrites aiguës (0 - 10 jours post partum): 1 ml pour 50 kg de poids corporel pendant 5 jours, en injection sous-cutanée.

### Porcs:

- Infections bactériennes respiratoires : 1 ml pour 16 kg de poids corporel pendant 3 jours, en injection intramusculaire.

Bien agiter avant emploi et ne pas administrer plus de 13 ml par point d'injection chez les bovins et plus de 4 ml par point d'injection chez les porcs. Les injections successives doivent être administrées en différents points.

## DÉLAIS D'ATTENTE

- Viande et abats:

Bovins : 6 jours.

Porcs : 2 jours.

- Pour le lait : 0 jour.

## CONDITIONNEMENT

Fiole de 50 ml et 100 ml.



sales@interchemie.com | interchemie.com

Produit par  
Interchemie werken "De Adelaar" B.V.  
Metaalweg 8, Venray, Pays-Bas

XFICES-FR-01-09092020